

BRODY VOSKOVÉ BLOKY

Rodenticídna návnada v tvare parafínových blokov pripravená na použitie. **NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE.**
Na použitie v budovách a okolo nich. Pred použitím postupujte podľa pokynov na štítku

ZLOŽENIE

100 gramov produktu obsahuje: Brodifakum (CAS č. 56073-10-0) 0,005 g, Denatonium benzoát (CAS č. 3734-33-6) 0,001 g Prídavné a chutné látky na doplnenie na 100 g

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE:

H360D – Môže poškodiť nenarodené dieťa. **H373** – Môže spôsobiť poškodenie krvi pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Používajte len na odborné použitie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. **P202** – Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. **P280** – Noste ochranné rukavice.

P308+P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhladajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 – Zlikvidujte obsah / nádobu v súlade s platnými národnými predpismi.

Zákaz opakovaného použitia obalu.

BIOCÍDNY VÝROBOK (PT14)

Povolenie Ministerstva hospodárstva č. SK16-MRS-006-2059/15

UFI kód: EWTW-FU7D-900V-7PME

Držiteľ autorizácie: KOLLANT S.r.l., Via C. Colombo, 7/7A - 30030 Vigonovo (VE) Taliansko - Tel. +39049 9983000

Výrobné, baliace a kontrolné zariadenia: KOLLANT S.r.l. - Via C. Colombo, 7/7A - 30030 Vigonovo (VE) Taliansko

Hmotnosť: 15 kg (obsahuje rodenticídne návnady v parafínových blokoch s hmotnosťou 20 g)

Číslo šarže / Dátum výroby: pozrite pečiatku

Doba potreby: 24 mesiacov od dátumu výroby

INFORMÁCIE PRE LEKÁRA

Tento výrobok obsahuje antikoagulačnú látku. Pri požití môžu oneskorene pozorované príznaky zahŕňať krvácanie z nosa a krvácanie dasien. V závažných prípadoch môže dôjsť k tvorbe podliatin a výskytu krvi v stolici alebo v moči. **Protijed: Vitamín K1 podaný výhradne lekárom/veterinárnym personálom. V prípade: Vystavenia pokožky,** opláchnite pokožku vodou a potom vodou a mydlom. **Vystavenia očí,** vypláchnite oči kvapalinou na vypláchnutie očí alebo vodou, udržiajte očné viečka otvorené najmenej 10 minút. **Orálne expozície** ústa starostlivo vypláchnite vodou. Nikdy nič orálne nepodávajte osobe v bezvedomí. Nevývolávajte zvracanie. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte nádobu alebo štítko produktu. V prípade, že výrobok požije domáce zvieratá, kontaktujte veterinárneho lekára. Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá. V prípade potreby kontaktovať príslušné toxikologické informačné centrum: Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Pracovisko Nemocnice akad. L. Déreka, Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. číslo : 02-547 74 166.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

BRODY VOSKOVÉ BLOKY je rodenticídna návnada pripravená na použitie na základe antikoagulačnej účinnej látky s názvom brodifakum, účinnej proti myši domácej (*Mus musculus*), sivému potkanovi (*Rattus norvegicus*), čiernemu potkanovi (*Rattus rattus*) aj po jednorazovom podaní. Prípravok má tvar „parafínového bloku“, ktorý je chutný pre uvedené druhy hlodavcov. Výrobok neupozorňuje ani nespôsobuje podozrenie u ostatných členov populácie hlodavcov. Prípravok BRODY VOSKOVÉ BLOKY obsahuje horkú látku, ktorá zabraňuje náhodnému požitiu deťmi. Prípravok BRODY VOSKOVÉ BLOKY sa môže používať v priemyselných budovách (vrátane skladov, úložísk, lodných skladov), vo vidieckych, civilných budovách, v domoch, skladoch, garážach, skrinách, parkoch a prístavbách vonkajších priestorov.

CIEĽOVÝ ORGANIZMUS

Myš domová (*Mus musculus*), mladé aj dospelé jedince. Sivý potkan (*Rattus norvegicus*), mladé aj dospelé jedince.

Čierny potkan (*Rattus norvegicus*), mladé aj dospelé jedince.

METÓDA APLIKÁCIE

BRODY VOSKOVÉ BLOKY je návnada pripravená na použitie vo forme parafínového bloku, ktorá sa používa na náležité označených návnadových staniach chránených pred poveternostnými vplyvmi, požitím necieľových druhov a uvoľňovaním do životného prostredia.

OZNAČENIE POUŽITIA A UPOZORNENIA

Pred použitím si prečítajte a dodržiavajte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie sprevádzajúce výrobok alebo poskytnuté v mieste jeho predaja. Pred umiestnením návnad preskúmajte zamorenú oblasť a na mieste posuďte druhy hlodavcov, ich aktivitu a určte pravdepodobné príčiny a rozsah zamorenia. Odstráňte potraviny, ktoré sú hlodavce schopné jednoducho dosiahnuť (napr. rozsypané zrnó alebo potravinový odpad). Okrem toho, zamorenú oblasť pred ošetrením nečistíte, pretože to narušia populáciu hlodavcov a prijatie návnady je ťažšie. Výrobok sa musí používať výlučne v rámci integrovaného systému ochrany proti škodcom (IPM), ktorý zahŕňa okrem iného aj hygienické opatrenia a, ak je to možné, metódy fyzickej kontroly. Berte do úvahy kontrolné preventívne opatrenia (napr. utesnenie dier, ak je to možné, odstránenie všetkých potravín a zdrojov vody) s cieľom overiť množstvo spotrebovaného produktu a znížiť možnosť opätovného zamorenia. Návnady by mali byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti miest, kde boli predtým pozorované aktivity hlodavcov (napr. chodníky, miesta hniezdenia, výbehy, otvory, nory atď.). Ak je to možné, stanice s návnadou musia byť pripevnené k zemi alebo iným konštrukciám. Návnady musia byť jasne označené tak, aby bolo jasné, že obsahujú rodenticídy a že sa nesmú premiestňovať alebo otvárať. Ak sa výrobok používa vo verejných priestoroch, ošetrované zóny musia byť počas hubenia škodcov označené. V blízkosti návnad by malo byť uvedené varovanie o primárnom a sekundárnom riziku otravy antikoagulanciami, s opatreniami prvej pomoci v prípade otravy. Návnadu upevnite tak, aby ju nebolo možné vytiahnuť z návnadovej stanice. Umiestnite výrobok mimo dosahu



NEBEZPEČENSTVO

detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a iných necieľových druhov zvierat. Výrobok umiestnite mimo zdroja potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia alebo povrchov, ktoré sú s nimi v kontakte. Počas manipulácie s výrobkom používajte chemicky odolné ochranné rukavice. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite a ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a výrobku vystavenú pokožku. Frekvencia kontrol oblastí pôsobenia by mala byť na základe uváženia prevádzkovateľa, berúc do úvahy prieskum pri nasadení návnad. Táto frekvencia by mala byť v súlade s odporúčaniami stanovenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov. Ak je spotreba návnady nízka v porovnaní s rozsahom viditeľného zamorenia, zväzťe premiestnenie návnadových bodov na iné miesta a možnosť zmeny typu prípravku. Ak sa po 35-dňovej dobe pôsobenia návnady ešte stále spotrebúvajú, ale nespozorovali ste zníženie aktivity hlodavcov, musí sa určiť najpravdepodobnejšia príčina. Ak už boli vylúčené iné prvky, je pravdepodobné, že niektoré hlodavce sú odolné: ak je to možné, vezmite do úvahy použitie neantikoagulačného rodenticídu alebo účinnejšieho antikoagulačného rodenticídu. Zväzťe tiež použitie pascí ako alternatívne kontrolné opatrenia. Na konci obdobia ošetrovania odstráňte zostávajúce návnady alebo návnadové stanice.

DÁVKOVANIE A METÓDA POUŽITIA

Použitie vnútri budov Kontrola domovej myši (*Mus musculus*). Do každej stanice umiestnite 40 g BRODY VOSKOVÉ BLOKY, t.j. 2 ks parafínových blokov pripravených na použitie s hmotnosťou 20 g na každú stanicu. Ak je potrebných niekoľko návnadových staníc, umiestnite ich vo vzdialenosti približne 5 – 10 metrov od seba a v každom prípade vo vzdialenosti najmenej 5 metrov od seba. Stanice by sa mali kontrolovať každé 2 – 3 dni na začiatku pôsobenia a potom aspoň týždenne. Tým sa overí, či ostali stanice neporušené, či sa návnada spotrebovala a, či treba odstrániť telá hlodavcov. V prípade potreby pridajte viac návnady. Dodržujte všetky dodatočné pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Použitie vnútri budov Na kontrolu sivého potkana (*Rattus norvegicus*) a čierneho potkana (*Rattus rattus*).

Do každej stanice umiestnite 60 – 100 g návnady BRODY VOSKOVÉ BLOKY, t.j. 3 – 5 ks parafínových blokov pripravených na použitie s hmotnosťou 20 g na každú stanicu. Ak je potrebných niekoľko návnadových staníc, umiestnite ich vo vzdialenosti približne 5 – 10 metrov od seba a v každom prípade vo vzdialenosti najmenej 5 metrov od seba. Stanice by sa mali kontrolovať každých 5 – 7 dní na začiatku pôsobenia a potom aspoň týždenne. Tým sa overí, či ostali stanice neporušené, či sa návnada spotrebovala a, či treba odstrániť telá hlodavcov. V prípade potreby pridajte viac návnady. Dodržujte všetky dodatočné pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Použitie vonku a v okolí budov Kontrola domovej myši (*Mus musculus*).

Do každej stanice umiestnite 40 g BRODY VOSKOVÉ BLOKY, t.j. 2 ks parafínových blokov pripravených na použitie s hmotnosťou 20 g na každú stanicu. Ak je potrebných niekoľko návnadových staníc, umiestnite ich vo vzdialenosti približne 5 – 10 metrov od seba a v každom prípade vo vzdialenosti najmenej 5 metrov od seba. Chráňte návnadu pred atmosférickými vplyvmi (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite návnadové stanice na miesta, ktoré nie sú vystavené záplavám. Návnadové stanice by sa mali kontrolovať minimálne každé 2 až 3 dni na začiatku pôsobenia a minimálne týždenne potom, aby sa skontrolovalo, či je návnada prijatá, či sú návnadové stanice neporušené a aby sa odstránili telá hlodavcov. V prípade potreby škatulu znovu naplňte. Nepoužívajte priamo v norách zvierat. Vymeňte návnadu v stanici s návnadou, ak bola návnada poškodená vodou alebo inak znečistená. Dodržujte všetky dodatočné pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Použitie vonku a v okolí budov Na kontrolu sivého potkana (*Rattus norvegicus*) a čierneho potkana (*Rattus rattus*).

Do každej stanice umiestnite 60 – 100 g návnady BRODY VOSKOVÉ BLOKY, t.j. 3 – 5 ks parafínových blokov pripravených na použitie s hmotnosťou 20 g na každú stanicu. Ak je potrebných niekoľko návnadových staníc, umiestnite ich vo vzdialenosti približne 5 – 10 metrov od seba a v každom prípade vo vzdialenosti najmenej 5 metrov od seba. Chráňte návnadu pred atmosférickými vplyvmi (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite návnadové stanice na miesta, ktoré nie sú vystavené záplavám. Návnadové stanice by sa mali kontrolovať minimálne každých päť až sedem dní na začiatku pôsobenia a minimálne týždenne potom, aby sa skontrolovalo, či je návnada prijatá, či sú návnadové stanice neporušené a aby sa odstránili telá hlodavcov. V prípade potreby škatulu znovu naplňte. Nepoužívajte priamo v norách zvierat. Vymeňte návnadu v stanici s návnadou, ak bola návnada poškodená vodou alebo inak znečistená. Dodržujte všetky dodatočné pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

OPATRENIA NA ZNÍŽENIE RIZIKA

Ak je to možné, pred hubením informujte všetkých účastníkov prebiehajúcej kampane na kontrolu hlodavcov. Nepoužívajte v miestach, kde je možné predpokladať odolnosť voči účinnej látke. Na zníženie rizika sekundárnej otravy v priebehu ošetrovania pravidelne vyhľadávajte a odstraňujte mŕtve hlodavce (napr. najmenej dvakrát týždenne). Pri umiestňovaní návnadových staníc v blízkosti povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo drenážnych systémov zabezpečte, aby sa zabránilo kontaktu návnady s vodou. Výrobok sa nesmie používať dlhšie ako 35 dní bez posúdenia stavu zamorenia a účinnosti liečby. Nepoužívajte návnady s aktívnymi antikoagulačnými látkami ako trvalé návnady na prevenciu alebo monitorovanie hlodavcov. Medzi aplikáciou a nasledujúcou neoplachujte návnadové stanice vodou. Zlikvidujte mŕtve hlodavce podľa platných predpisov. Na konci spracovania zlikvidujte nepoužitý návnadu a obal podľa platných predpisov. Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte kontajner uzavretý a vyhýbajte sa priamemu slnečnému svetlu. Skladujte na miestach, ktoré nie sú prístupné deťom, vtákom, domácim zvieratám a hospodárskym zvieratám.

INÉ INFORMÁCIE

Kvôli svojmu oneskorenému účinku môže účinok antikoagulačného rodenticídu trvať od 4 do 10 dní, aby boli účinné po účinnej spotrebe návnady. Hlodavce môžu byť nosičmi chorôb. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo nástroje ako sú kliešte. Tento výrobok obsahuje horké činidlo a farbivo.

Čas potrebný na biocídny účinok: 4-10 dní

Distribútor:

EKOLAS SK, s.r.o. Paderovce, Pol'ná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská Republika Tel.: +421 33 5592096