

MUSKIL WB-50F

FLUO-NP®

Bromadiolón 0,0025% - Difenakum 0,0025%

Rodenticídna návnada na okamžité použitie vo forme blokov (typ výrobku 14) na kontrolu myši domovej a potkana hnedého vo vnútorných priestoroch a vonku okolo budov; vo vonkajších otvorených oblastiach a na skládkach odpadu (iba potkan hnedý) LEN PRE VYŠKOLENÝCH PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV

MUSKIL® WB-50F - Rodenticídna návnada na okamžité použitie vo forme blokov (typ výrobku 14)

Obsahuje bromadiolón (CAS číslo 28772-56-7, ES číslo 249-205-9) 0,0025% (=0,025 g/kg)
a difenakum (CAS č. 56073-07-5, ES č. 259-978-4) 0,0025% (=0,025 g/kg)

Výstražné upozornenia:

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia:

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P260 Nevdychujte prach.

P280 Noste ochranné rukavice.

P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Doplňkové informácie:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Číslo autorizácie: SK18-MRS-021

Držiteľ autorizácie / Dodávateľ:

ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (PD) Taliansko - Tel. +390499597737

LEN NA ODBORNÉ POUŽITIE

VLASTNOSTI:

MUSKIL WB-50F je dvojsložková patentovaná rodenticídna návnada vo forme voskových blokov po 20 g (voľné bloky), založená na kombinovanom spojení dvoch antikoagulačných účinných látok druhej generácie, Bromadiolónu a Difenakumu, vyváženom tak, aby produktu umožnil efektívny účinok na hubenie myši domovej (*Mus musculus*) a potkana hnedého (*Rattus norvegicus*) vo všetkých vývojových štádiách (dospelé jedince a mláďatá). Vďaka jeho spôsobu pôsobenia dochádza k úmrtiu hlodavcov bez vyvolania podozrenia voči návnade u ostatných členov kolónie.

Blok je formulovaný technológiou FLUO-NP®: vďaka technológii fluorescenčných pigmentov môže byť návnada ľahko identifikovaná aj pri zlých svetelných podmienkach, ak je osvetlená UV lampou. Po požití návnady je trus hlodavcov vďaka fluorescenčnej formulácii jasne viditeľný pod ultrafialovým svetlom, čo poskytuje možnosť sledovať aktivitu hlodavcov.



NEBEZPEČENSTVO

Návnada vo forme blokov obsahuje cukry a zložky potravinového pôvodu, čo ju robí atraktívnou pre vyššie uvedené druhy hlodavcov. Mnohopočetné hrany bloku uľahčujú konzumáciu návnady, vďaka prirodzenej schopnosti hlodavcov ohlodávať a obsah parafínu robí návnadu obzvlášť odolnou a vhodnou na použitie vo vlhkých podmienkach.

MUSKIL WB-50F má jedinečné zloženie (európsky patent č. 2 090 164 B1) vyvinuté tak, aby sa využila výhoda kombinácie dvoch účinných látok na masívnu kontrolu vyššie uvedených druhov hlodavcov.

MUSKIL WB-50F má stredový otvor, ktorý umožňuje jeho pevné ukotvenie v deratizačných staničkách. Táto vlastnosť umožňuje sledovať spotrebu návnady a znižuje možnosť, že návnada bude odtiahnutá z deratizačných staničiek preč.

Výrobok obsahuje horkú látku (Denatónium - benzoát), ktorá pomáha predchádzať konzumácii ľuďmi.

MUSKIL WB-50F sa môže používať vo vidieckych, civilných a priemyselných budovách (vrátane skladov, depozitov, lodí), v domoch, pivniciach, garážach, šatníkoch a v ich okolí. Môže byť použitý aj v závodoch na rozvod elektrickej energie a v dopravných prostriedkoch.

INŠTRUKCIE NA POUŽITIE:

Kategória používateľov: vyškolení profesionáli.

Spôsob aplikácie: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii alebo v zakrytých a chránených miestach s návnadou (vo vnútorných priestoroch a vonku) alebo na priame použitie do brlohov (len vonku).

Aplikačné dávky a časový rozvrh:

Na kontrolu myši domovej (Mus musculus) – na použitie vo vnútorných priestoroch a vonku okolo budov:

- Veľké zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2m od seba.
- Nízke zamorenie: do 50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5m od seba.

Na kontrolu potkana hnedého (Rattus norvegicus) – na použitie vo vnútorných priestoroch a vonku okolo budov, vo vonkajších otvorených oblastiach a na skládkach odpadu:

- Veľké zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5m od seba.
- Nízke zamorenie: do 100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 10m od seba.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok (s výnimkou prípadov, keď je priamo aplikovaný do nôr). Keď to je možné, odporúča sa, aby sa ošetrovaná oblasť skontrolovala najmenej každé 4 týždne, aby sa predišlo selekcii rezistentnej populácie.

V prípade použitia vonku: Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou. Na vonkajšie použitie miesta s návnadou musia byť zakryté a umiestnené na strategických lokalitách, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov.

Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat a detí.

Zakryte alebo zablokujte vstupy do brlohov s návnadou, aby ste znížili riziko odmietnutia a vysypania návnady.

POKYNY NA POUŽÍVANIE:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja. Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia. Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady. Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly. Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelech, brlohy atď.). Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám. Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť. Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy. Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej staničky. Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat. Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku. Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (EN 374, kategória III). Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku. Frekvencia prezerania deratizovanej oblasti by mala byť ponechaná na vlastné uváženie vykonávateľa vzhľadom na prieskum vykonaný na začiatku deratizácie. Miesta, kde je návnada priamo aplikovaná do nôh, by sa mali prezerat častejšie ako miesta, kde sa používajú deratizačné staničky. Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek/miest s návnadou na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady. Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné prvky, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, ak je dostupný, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

OPATRENIA NA ZMIERNENIE RIZIKA:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov. Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie. Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.

Trvalé umiestnenie návnad je striktno obmedzené na miesta s vysokým potenciálom opätovnej invázie, keď sa ostatné metódy kontroly preukázali ako nedostatočné.

Stratégia trvalého umiestnenia návnad sa pravidelne reviduje v rámci integrovanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizík pre opätovné zamorenie. Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad. Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku. Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnateľnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistencie. Na striedavé použitie zvážte použitie neantikoagulantného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu. Medzi aplikáciami neumývajte vodou deratizačné staničky ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrytých a chránených miestach s návnadou. Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

NÁVOD NA POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI A NÚDZOVÉ OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Tento výrobok obsahuje dve antikoagulantné látky. Pri prehltnutí môžu symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňať krvácanie z nosa a krvácajúce dŕasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

V prípade:

- Dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom.
- Zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút.
- Orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou. Nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí. Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltnie domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom. Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „MUSKIL WB-50F alebo Číslo autorizácie: SK18-MRS-021“, „účinné látky: bromadiolón a difenakum“ a „v prípade nehody volajte do Národného toxikologického informačného centra +421 2 54 774 166“.

V prípade použitia vo vnútorných priestoroch: Keď umiestňujete miesta s návnadou blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

V prípade použitia vonku: Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu: Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami.

Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku: Uchovávajú na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia. Uchovávajú na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.

Ďalšie informácie: Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady. Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte. Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

NEODSTRAŇUJTE VNÚTORNÉ VRECKO Z OBALU.

Výrobca prípravku:

Zapi S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), Taliansko,
telefón +39/049/9597737

Muskil® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Zapi

Distribútor:

EKOLAS SK, s.r.o. Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice,
Tel.: +421 33 5592096, www.ekolas-profesional.sk, ekolas@ekolas.sk



